

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

### **BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale Bromure de céthexonium, Citrate de phényltoxamine**

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?

3. COMMENT UTILISER BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**1. QU'EST-CE QUE BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

PREPARATION NASALE POUR USAGE LOCAL

(R : système respiratoire)

Ce médicament contient un antiseptique de la famille des ammoniums quaternaires, le céthexonium et un antihistaminique, la phényltoxamine.

Il est indiqué dans le traitement local d'appoint antiseptique et antiallergique des rhinites.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?**

**Ne prenez jamais BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale dans les cas suivants :**

- allergie connue aux constituants du produit et en particulier aux antiseptiques de la classe des ammoniums quaternaires, aux antihistaminiques et au glycérol,
- difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,
- glaucome (augmentation de la pression dans l'œil).

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE pendant le premier trimestre de la grossesse.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

**Faites attention avec BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale :**

### **Mises en garde spéciales**

En cas d'écoulement nasal purulent, fièvre, maux de tête importants, douleur de l'oreille ou autres symptômes associés, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

**Dès l'ouverture du conditionnement, et à *fortiori* dès la première utilisation d'une préparation à usage nasal, une contamination microbienne est possible. Ne pas garder trop longtemps une préparation à usage nasal entamée.**

*EN CAS DE DOUTE, N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### **Prise d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **Grossesse et allaitement**

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, pendant le premier trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Par la suite et notamment en fin de grossesse, la prise abusive de médicament peut entraîner des effets néfastes chez le nouveau-né. Par conséquent, il convient de toujours

demander l'avis de votre médecin avant de l'utiliser et de ne jamais dépasser la dose et la durée de traitement préconisées.

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, la prise de ce médicament pendant l'allaitement est à éviter.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les possibilités de somnolence ou de baisse de vigilance attachées à l'usage de ce médicament.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool.

**Liste des excipients à effet notoire :** Glycérol.

### **3. COMMENT UTILISER BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?**

#### **Posologie**

Adulte : 1 pulvérisation dans chaque narine 4 à 6 fois par jour.

Enfant : 1 pulvérisation dans chaque narine 2 à 3 fois par jour.

Nourrisson : 1 pulvérisation dans chaque narine 1 à 2 fois par jour.

#### **Mode et voie d'administration**

VOIE NASALE

Les pulvérisations nasales se font avec le flacon en position verticale après s'être mouché.

#### **Durée du traitement**

Le traitement ne devra pas dépasser quelques jours.

**Si vous avez pris plus de BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale que vous n'auriez dû :**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, **BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale** est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Certains nécessitent de consulter un médecin :

- modifications de la formule sanguine (baisse importante des globules blancs, des plaquettes dans le sang) ;
- manifestations allergiques cutanées (eczéma, prurit, purpura, urticaire) ;
- éternuements répétés allergiques avec écoulement nasal.

D'autres peuvent survenir :

- irritation nasale ;
- somnolence ;
- à fortes doses ou en cas de traitement prolongé : Sécheresse de la bouche, troubles visuels, palpitations, baisse de pression artérielle, troubles de l'équilibre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser **BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale** après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?**

### Les substances actives sont :

Bromure de céthexonium .....	50,00 mg
Citrate de phényltoxamine .....	174,20 mg
Pour 100 ml.	

### Les autres composants sont:

Excipients : Edétate de sodium, chlorure de sodium, glycérol, éthylvanilline, solution concentrée d'hydroxyde de sodium, eau purifiée.

**Qu'est-ce que BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour pulvérisation nasale. Boîte de 1 flacon pulvérisateur de 15 ml.

### Titulaire

**MENARINI FRANCE**

1/7, RUE DU JURA

SILIC 528

94633 RUNGIS CEDEX

**Exploitant**

**MENARINI FRANCE**

1/7, RUE DU JURA

SILIC 528

94633 RUNGIS CEDEX

**Fabricant**

**LABORATOIRES BERLIN-CHEMIE AG**

GLIENICKER WEG 125

12489 BERLIN

ALLEMAGNE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 27 mai 2010.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).